

NOTES ICHTHYOLOGIQUES SUR CERTAINES ESPÈCES CAPTURÉES AU COURS DES CAMPAGNES DE L'INSTITUT DES PÊCHES (1957-1961)

par R. RAIMBAULT

RÉSUMÉ (1)

De 1957 à 1961 environ 150 chalutages furent effectués sur des fonds allant de 25 à 100 m dans le bassin occidental méditerranéen, aussi bien du côté septentrional que sur les côtes d'Afrique du nord. Une masse considérable de renseignements sur la répartition géographique et bathymétrique, sur l'abondance et la fréquence d'environ 160 espèces de poissons fut recueillie. Dans cet exposé quelques précisions seront fournies sur 23 espèces capturées, espèces plus ou moins rares ou présentant quelques particularités dans leur répartition. Ce sont :

1^o) *Argentina leioglossa* CUV. et VAL. Une trentaine d'exemplaires fut pêchée en 1958 sur la bordure est du golfe du Lion.

2^o) *Alepocephalus rostratus* RISSO. Capturé en toutes zones où des chalutages profonds ont été effectués. Abonde en particulier dans les eaux catalanes. Semble moins fréquent en Afrique du nord.

3^o) *Gonostoma denudatum* RAFINESQUE. Un exemplaire a été capturé en 1960 dans le détroit de Sicile.

4^o) *Bathophilus nigerrimus* GIGLIOLI. En 1959, un exemplaire fut pris au large de la frontière algéro-tunisienne.

5^o) *Stomias boa* (RISSO) ; 6^o) *Chauliodus sloani* SCHNEIDER. Aussi bien au nord qu'au sud les deux espèces ont été capturées à peu près en toutes zones, jamais abondantes, mais relativement fréquentes. La fréquence de *Stomias boa* est à peu près le double de celle de *Chauliodus*. L'une et l'autre espèces vivent à moindre profondeur sur les côtes d'Afrique du nord que sur les côtes septentrionales.

7^o) *Bathypterois dubius* VAILLANT. Quatre exemplaires furent capturés en 1957 dans le sud-est de la Corse. Ceci porte à une dizaine le nombre des exemplaires méditerranéens mentionnés.

8^o) *Paralepis rissoi* BONAPARTE. Quatre exemplaires furent capturés : deux à l'ouest (NE du cap Creux), un au large de St-Tropez, un au large de Béni-Saf (Algérie).

9^o) *Nettastoma melanura* RAFINESQUE. Cinq exemplaires capturés du côté septentrional : Catalogne et Corse orientale. Six exemplaires du côté méridional entre Philippeville et Bône (Algérie).

10^o) *Nemichthys scolopaceus* RICHARDSON. Trois exemplaires ont été capturés entre la Corse et l'île Pianosa.

11^o) *Notacanthus bonaparti* RISSO. Douze exemplaires furent pris au SE de la Corse ; quarante-six exemplaires en huit traicts au large de l'Algérie.

(1) La communication in extenso de cet article paraîtra dans le tome xxvii, fasc. 2 de la *Revue des Travaux de l'Institut des Pêches maritimes*.

12^o) *Polyacanthonotus rissoanus* FIL. et VEV. Un exemplaire fut pris en 1957 dans le SE de la Corse.

13^o) *Mora mora* (Risso) ; 14^o) *Haloporphyrus lepidion* (Risso). Fréquents et abondants dans les grands fonds des côtes septentrionales, aussi bien à l'ouest (Catalogne), qu'à l'est (Corse) ces deux espèces, au contraire, n'ont pas été capturées du côté Afrique du nord.

15^o) *Coelorhynchus vaillanti* ROULE 1916. Cette espèce est à inscrire au catalogue des poissons méditerranéens. Trois exemplaires ont été capturés : un à l'ouest (Port-Vendres), un au large de St-Tropez et un à l'est de la Corse.

16^o) *Hymenocephalus italicus* GIGLIOLI. Présent aussi bien au nord qu'au sud du bassin occidental la fréquence de ce poisson augmente nettement en allant de l'ouest vers l'est. Du côté septentrional en particulier, on note un seul traict positif dans le secteur Catalogne-Rousillon.

17^o) *Centracanthus cirrus* RAFINESQUE. Un exemplaire a été pris en 1959 au large de la frontière algéro-marocaine et environ 1800 en un traict opéré au voisinage des îles Baléares.

18^o) *Acantholabrus palloni* RISSO. Deux exemplaires furent capturés en 1958 sur la bordure est du golfe du Lion.

19^o) *Grammonus armatus* (DODERLEIN). Trois exemplaires furent capturés en 1960 en trois traicts, entre Philippeville et la frontière algéro-tunisienne.

20^o) *Scorpaena elongata* CADENAT. Un exemplaire fut capturé au large de Port-Vendres et 173 sur les côtes d'Afrique du nord, avec une fréquence nettement décroissante d'ouest en est.

21^o) *Trachyscorpia cristulata* (GOODE et BEAN). Un exemplaire pris en 1959 à l'est nord-est du cap Negro : première capture signalée qui permet d'inscrire ce scorpène au catalogue des espèces méditerranéennes.

22^o) *Arnoglossus rueppellii* (COCCO). Cinq exemplaires furent capturés en trois traicts du côté septentrional (régions de Port-Vendres et de Marseille). Du côté sud 17 exemplaires en cinq traicts, 4 entre Alger et Bône, 1 détroit de Sicile.

23^o) *Arnoglossus imperialis* RAFINESQUE. Un exemplaire fut pris dans l'ouest du golfe du Lion, région de Port-Vendres.

Institut des Pêches maritimes. Laboratoire de Sète.