

La pollution des sédiments marins par les métaux lourds dans les côtes occidentales algériennes est peu connue. A ce titre nous avons réalisé une étude systématique en Mars 1990 pour déterminer le niveau de pollution des sédiments marins superficiels. La zone d'étude s'étend de la frontière algéro-marocaine jusqu'à Ténes (Figure 1).

Les échantillons ont été congelés dès leur prélèvement pour l'analyse des éléments: As, Cd, Cr, Cu, Pb et Zn. Ces échantillons ont subi un traitement et une analyse par spectrophotométrie d'absorption atomique selon les méthodes décrites par AMINOT et CHAUSSEPIED (1983) et UNEP/IAEA (1985 a, b, c, et d).

Les concentrations obtenues pour la plupart des métaux dosés ne présentent pas de valeurs très élevées. En moyenne, elles sont inférieures à celles observées dans les sédiments superficiels de la baie d'Alger (AOUAMEUR, 1990). Cependant nous avons observé des maxima excessivement élevés pour certains métaux tels que le Cadmium (Tableau 1).

La distribution spatiale de ces résultats montre une bonne cohérence avec les conditions naturelles et anthropiques que subit la zone d'étude. Les valeurs maximales délimitent une région bien définie qui s'étend de Beni Saf jusqu'à Oran. Les valeurs élevées (> 20 % de la valeur moyenne) sont présentes dans toute la zone. Leur fréquence et leur coexistence varient d'un endroit à l'autre. La corrélation non significative trouvée entre les différents éléments à l'échelle du site évoque l'influence d'anomalies de pollution qui affectent le comportement et l'affinité géochimique des éléments.

Les radiales P et Q se trouvent à proximité de l'Oued Tafna, de Beni Saf et d'un gisement minier. Les rejets de l'exploitation minière ou les affleurements du gisement sont l'origine principale de cette pollution en métaux lourds dans cette zone. Dans la radiale N, les valeurs élevées entre les îles Habibas et la côte peuvent être dues au tourisme très développé dans ce site. Elle peuvent évoquer aussi l'extension du gisement signalé (ou de sa pollution) vers l'Est ou bien la présence d'activités ignorées dans cette zone. La valeur maximale du cadmium, accompagnée d'une valeur élevée de plomb le long de la radiale N, suggère plutôt une pollution anthropique que l'influence d'une source naturelle. Les concentrations élevées de plomb le long des radiales M et N sont surtout le résultat de la pollution atmosphérique par les gaz d'échappement de voitures comme le montre GROUSSET (1989). Dans le Golfe d'Arzew, la zone industrielle est à l'origine des concentrations élevées de la radiale K.

Dans la partie Est de la zone d'étude deux valeurs sont remarquablement élevées. L'une du chrome qui se situe juste à l'embouchure de l'Oued Chelif et l'autre du cadmium et se trouve le long de la radiale H. Du côté Ouest, malgré l'importance de la pollution signalée dans la zone de Ghazaouet avec son industrie de zinc (SOUIKI, 1991), on n'observe pas de valeurs inquiétantes. Près de Ghazaouet, la concentration du zinc observée à 20 m de profondeur est de 148.1 µg/g (septième valeur de la zone étudiée).

Par comparaison à d'autres sites en Algérie on peut conclure que le site étudié ne présente pas une pollution alarmante. Cependant, la zone de Beni Saf - Golfe d'Arzew est une zone à risque de pollution. Il convient d'identifier et de surveiller les sources de pollution notamment pour cette zone et pour les valeurs très élevées de cadmium et de chrome observées le long des radiales H et I, respectivement.

Figure 1: Concentrations maximales et élevées des métaux analysés dans la zone étudiée




Tableau 1.- Concentrations (C) maximales, minimales et moyennes (en µg/g)

#### REFERENCES

- AMINOT A. & CHAUSSEPIED M., 1983. CNEXO, BNDO/Document., Brest, 393p.
- AOUAMEUR D., 1990. Mémoire d'ingénieur d'état, ISMAL, 62p.
- GROUSSET F., 1989. *Le courrier du CNRS*, N° 72, 35-36p.
- SOUIKI M., 1991. *Rapport de pollution*. Wilaya de Tlemcen, 38p.
- UNEP/IAEA, 1985 (a). *Reference Methods for Marine Pollution Studies*, N°27, UNEP, 13p.
- UNEP/IAEA, 1985 (b). *Reference Methods for Marine Pollution Studies*, N°31, UNEP, 13p.
- UNEP/IAEA, 1985 (c). *Reference Methods for Marine Pollution Studies*, N°33, UNEP, 13p.
- UNEP/IAEA, 1985 (d). *Reference Methods for Marine Pollution Studies*, N°34, UNEP, 13p.

The disposal of inert material derived from large civil engineering works together with the need to recover new areas of coast for tourism, port and related services has often lead to the choice of coastal areas for waste disposal and thus to a series of ambiental problems.

In this work, the Riva Ligure (Imperia-Italy) waste disposal site is analysed for its impact on the underlying sediments and the surrounding water mass.

The disposal site is located between the mouth of the Argentine stream and the urban centre of Riva Ligure, at the centre of the physiographic unit bound to the west by Capo Verde promontory and to the east by Punta Santo Stefano. The material in the site comes almost exclusively from the digging of tunnels (Capo Negro and Santo Stefano) for the new Genoa-Ventimiglia railway line. Waste for a total volume of 126,000 m<sup>3</sup> were discharged into the sea between March 1988 and December 1989.

The dynamics of diffusion of the dumped material has been studied from the wave refraction and it is seen that the area of coast involved is mostly protected by the reigning wave motion (SW) but not against the less frequent but more violent Libeccio storms.

The study of coastal transport (CERC, 1973) has shown a general component north-eastwards but very low in comparison with the maxima found in the area. The HATTORI and KAWAMATA (1980) index-measuring method utilized for assessment of transversal transport has shown that waves incide orthogonally to the coast causing erosive phenomena but infrequently.

Analysis carried out on the water mass (temperature, salinity, density, nutrients, suspended matter) outlined three different patterns of coastal circulation (from north-west, east and south-west) depending on wind and sea conditions. The distribution of hydrological parameters (T, S, 6-t) has shown that thermal and haline variations depend not only on dispersion into the sea of freshwater but also on the mixing processes linked to the surrounding meteoceanic conditions. The concentrations of nutrients are low and conditioned by the freshwater input. Within the nutrients, nitrates are absent or in very reduced concentrations. On the contrary, nitrates, silicates, ammonia and phosphates show highest concentrations near the mouth of Argentine stream (maximum values : 16.2 µmol/l, 35.5 µmol/l, 3.62 µmol/l, 0.29 µmol/l respectively). The concentrations of these latter nutrients decrease offshore (mean values: 0.3 µmol/l, 1.7 µmol/l, 0.6 µmol/l, 0.08 µmol/l respectively). The suspended particle distribution is also linked to fluvial inputs, to the nearness to or distance from the dump, and to wave action. The highest concentrations were found near the surface, close to the main stream outlets (2.5 mg/l on average) and to the dump area (5mg/l on average). The diffusion of the suspended particles seems to be related to different pressure regimes which determine the concentration and dispersion of the particles within the surface layer (above 5 m depth). Since the prevailing winds in the zone are from the first quadrant, on average the dispersion is to the SW. Except for the stations near the tidal zone, suspended particle concentrations are generally low throughout the column (0.4 mg/l).

The textural distribution of sediments and the analysis of granulometric data highlight the progression of sands over pebbly sands, besides confirming the general dispersion of mobile bottom sediments eastwards. Moreover, the presence of areas of accumulation near the dump characterised by a higher level of pebble than the surrounding sediments is to be noted. This phenomenon is due to the gradual effects of wave motion on the front of the waste disposal site and to the release of fine materials deriving from movement and dumping operations in the waste deposit. In particular, it was noted that material of medium and coarse sand dimensions tends to move in a direction subparallel to the coast as far as the 4 m isobath, whereas fine and very fine sand moves between the 4 and 15 m isobaths. Thus, one can say that the waste deposit contributes to the mobile bottom sediments supplying material of different granulometry. The coarser part of this material forms a layer in shallow waters, while very thin sand and pebble partly deposit close to the waste dump and partly move to the open sea settling at greater depths (to the 15 m isobath and beyond) mixing perfectly with the natural river and sea sediments present there.

Mineralogic, petrographic and geochemical analyses, carried out to distinguish material of the dump from sea and river sediments, generally confirmed the remarkably homogeneous composition.

Studies on the benthic population carried out during dumping operations highlighted the presence of biocoenoses typical of fine sediments in the waste disposal area. However, the proximity of the mouth of Argentine stream does not allow to distinguish the effect due to the waste disposal from that due to the stream itself (RELINI, pers.comm.).

The results of the present study lead to the conclusion that the dump being examined does not substantially alter the mineralogic-granulometric parameters of the sea bottom and physico-chemical parameters of the surrounding water mass. Only during the rare sea floods is the exposed front of the dump eroded, with the consequent transfer of heterogeneous material into the sea. The particular geographical position of the dump within the physiographic unit and the coastal dynamics in this part of the sea suggest that, at the end of the discharge process, material from the waste deposit will rapidly become incorporated into the natural sediments.

#### REFERENCES

- COASTAL ENGINEERING RESEARCH CENTER (C.E.R.C.), 1973. - Shore protection manual. U.S. Army, Corp of Eng., I, II, III, Washington.
- HATTORI M., KAWAMATA R. 1980. - Onshore-offshore transport and beach profile change. *Proc. of the 17th Coast. Eng. Conf.*, 1175-1194, Sydney.